

$$\frac{x_2}{x_1} = \frac{-k-1}{k-1} = -1 - \frac{2}{k-1} < -1$$

$$\frac{x_2}{x_1} = r(r < -1) \text{이라 하면 } x_2 = x_1 r, x_3 = x_1 r^2$$

세 점 A, B, C의 y좌표를 각각 y_1, y_2, y_3 이라 하면

두 직선 AB, AC의 기울기의 합이 0이므로

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} + \frac{y_3 - y_1}{x_3 - x_1} = \frac{\log_2 |kx_2| - \log_2 |kx_1|}{x_1(r-1)} + \frac{\log_2 |kx_3| - \log_2 |kx_1|}{x_1(r^2-1)}$$

$$= \frac{\log_2 \left| \frac{x_2}{x_1} \right|}{x_1(r-1)} + \frac{\log_2 \left| \frac{x_3}{x_1} \right|}{x_1(r^2-1)} = \frac{\log_2(-r)}{x_1(r-1)} + \frac{2\log_2(-r)}{x_1(r^2-1)} = 0$$

$$\text{에서 } 1 + \frac{2}{r+1} = 0, r = -3$$

$x_2 = x_1 r$ 에서

$$\frac{4}{k-1} = \frac{12}{k+1}, k+1 = 3k-3, k=2 \text{이고,}$$

$$m = \frac{4(k+1)}{k-1} = 12 \text{이므로 } m+k^2 = 16 \text{ (거짓)}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ

16. [출제의도] 도함수 이해하기

$$f(x) = x^2 + ax \text{에서 } f'(x) = 2x + a$$

$$f'(1) = 2 + a = 4 \text{에서 } a = 2$$

17. [출제의도] 삼각함수 이해하기

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{이므로}$$

$$(\sin \theta + \cos \theta)^2 = 1 + 2\sin \theta \cos \theta = 1 + 2 \times \frac{7}{18} = \frac{16}{9}$$

$$0 < \theta < \frac{\pi}{2} \text{에서 } \sin \theta > 0, \cos \theta > 0 \text{이므로}$$

$$\sin \theta + \cos \theta = \frac{4}{3}$$

$$\text{따라서 } 30(\sin \theta + \cos \theta) = 40$$

18. [출제의도] 도함수를 활용하여 문제해결하기

다항함수 $f(x)$ 가 $x=3$ 에서 극솟값 2를 가지므로

$$f(3) = 2, f'(3) = 0$$

$$g(x) = (x^2 - 2x)f(x) \text{에서}$$

$$g'(x) = (2x-2)f(x) + (x^2-2x)f'(x) \text{이므로}$$

$$g'(3) = 4f(3) + 3f'(3) = 8$$

19. [출제의도] 등비수열 이해하기

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 $r(r > 0)$ 이라 하자.

$$a_3 + a_5 = \frac{1}{a_3} + \frac{1}{a_5} \text{에서}$$

$$a_3 + a_5 = \frac{a_3 + a_5}{a_3 a_5}, a_3 a_5 = 1 \text{이므로}$$

$$\frac{1}{4} r^2 \times \frac{1}{4} r^4 = 1, r^6 = 16, r^3 = 4$$

$$\text{따라서 } a_{10} = \frac{1}{4} r^9 = \frac{1}{4} (r^3)^3 = 16$$

20. [출제의도] 사인법칙과 코사인법칙을 활용하여 문제해결하기

$$\overline{AB} : \overline{BC} : \overline{CA} = 1 : 2 : \sqrt{2} \text{에서}$$

삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA의 길이를

각각 $k, 2k, \sqrt{2}k(k > 0)$ 이라 하자.

삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의해

$$2k^2 = k^2 + 4k^2 - 4k^2 \cos(\angle ABC)$$

$$4k^2 \cos(\angle ABC) = 3k^2$$

$$\cos(\angle ABC) = \frac{3}{4} \text{이므로}$$

$$\sin(\angle ABC) = \sqrt{1 - \frac{9}{16}} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

삼각형 ABC의 외접원의 넓이가 28π 이므로

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이는 $2\sqrt{7}$ 이다.

따라서 삼각형 ABC에서 사인법칙에 의해

$$\frac{\overline{CA}}{\sin \angle ABC} = 4\sqrt{7} \text{이므로 선분 CA의 길이는 7이다.}$$

21. [출제의도] 수열의 귀납적 정의를 이용하여 추론하기

(i) $a_1 = 1$ 일 때

$$a_1 \geq 0 \text{이므로 } a_2 = a_1 - 2 = -1$$

$$a_2 < 0 \text{이므로 } a_3 = a_2 + 5 = 4$$

$$a_3 \geq 0 \text{이므로 } a_4 = a_3 - 2 = 2$$

$$a_4 \geq 0 \text{이므로 } a_5 = a_4 - 2 = 0$$

$$a_5 \geq 0 \text{이므로 } a_6 = a_5 - 2 = -2$$

$$a_6 < 0 \text{이므로 } a_7 = a_6 + 5 = 3$$

$$a_7 \geq 0 \text{이므로 } a_8 = a_7 - 2 = 1 = a_1$$

$$a_8 \geq 0 \text{이므로 } a_9 = a_8 - 2 = -1 = a_2$$

⋮

그러므로 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+7} = a_n \text{을 만족시키고 } a_{15} = a_8 = a_1 = 1$$

(ii) $a_1 = 2$ 일 때

(i)과 같은 방법으로 구하면 수열 $\{a_n\}$ 이 모든

자연수 n 에 대하여 $a_{n+7} = a_n$ 을 만족시키고

$$a_{15} = a_8 = a_1 = 2$$

(iii) $a_1 = 3$ 일 때

(i)과 같은 방법으로 구하면 수열 $\{a_n\}$ 이 모든

자연수 n 에 대하여 $a_{n+7} = a_n$ 을 만족시키고

$$a_{15} = a_8 = a_1 = 3$$

(iv) $a_1 = 4$ 일 때

(i)과 같은 방법으로 구하면 수열 $\{a_n\}$ 이 모든

자연수 n 에 대하여 $a_{n+7} = a_n$ 을 만족시키고

$$a_{15} = a_8 = a_1 = 4$$

(v) $a_1 = 5$ 일 때

$$a_1 \geq 0 \text{이므로 } a_2 = a_1 - 2 = 3$$

$$a_2 \geq 0 \text{이므로 } a_3 = a_2 - 2 = 1$$

$$a_3 \geq 0 \text{이므로 } a_4 = a_3 - 2 = -1$$

$$a_4 < 0 \text{이므로 } a_5 = a_4 + 5 = 4$$

$$a_5 \geq 0 \text{이므로 } a_6 = a_5 - 2 = 2$$

$$a_6 \geq 0 \text{이므로 } a_7 = a_6 - 2 = 0$$

$$a_7 \geq 0 \text{이므로 } a_8 = a_7 - 2 = -2$$

$$a_8 < 0 \text{이므로 } a_9 = a_8 + 5 = 3 = a_2$$

$$a_9 \geq 0 \text{이므로 } a_{10} = a_9 - 2 = 1 = a_3$$

⋮

그러므로 수열 $\{a_n\}$ 이 2 이상의 모든 자연수

n 에 대하여 $a_{n+7} = a_n$ 을 만족시키고

$$a_{15} = a_8 = -2 < 0$$

따라서 $a_{15} < 0$ 이 되도록 하는 a_1 의 최솟값은 5이다.

22. [출제의도] 정적분을 이용하여 추론하기

$$f(x) = 3x + a \text{이므로}$$

$$g(x) = \int_2^x (t+a)(3t+a) dt$$

$$= \int_2^x (3t^2 + 4at + a^2) dt$$

$$= \left[t^3 + 2at^2 + a^2 t \right]_2^x$$

$$= x^3 + 2ax^2 + a^2 x - (2a^2 + 8a + 8)$$

$$g(2) = 0 \text{이므로}$$

$$g(x) = (x-2)\{x^2 + 2(a+1)x + (a+2)^2\}$$

$$h(x) = (x-2)(3x+a)\{x^2 + 2(a+1)x + (a+2)^2\}$$

조건 (가)에 의해 곡선 $y = h(x)$ 위의

어떤 점에서의 접선이 x축이므로

$$h(k) = h'(k) = 0 \text{을 만족시키는 실수 } k \text{가 존재한다.}$$

그러므로 다항식 $h(x)$ 는 $(x-k)^2$ 을 인수로 가진다.

(i) $k=2$ 인 경우

다항식 $h(x)$ 가 $(x-2)^2$ 을 인수로 가지므로

다항식 $3x+a$ 가 $3(x-2)$ 이거나

다항식 $x^2 + 2(a+1)x + (a+2)^2$ 이 $x-2$ 를

인수로 가진다.

(a) $3x+a=3(x-2)$ 인 경우


$$a = -6 \text{이므로}$$

$$h(x) = (x-2)(3x-6)(x^2 - 10x + 16)$$

$$= 3(x-2)^3(x-8)$$

곡선 $y = |h(x)|$ 는 그림과 같으므로

함수 $h(x)$ 는 조건 (나)를 만족시킨다.



이 경우 $h(-1) = 729$ 이다.

(b) 다항식 $x^2 + 2(a+1)x + (a+2)^2$ 이

$x-2$ 를 인수로 갖는 경우

$$4 + 4(a+1) + (a+2)^2$$

$$= a^2 + 8a + 12$$

$$= (a+2)(a+6) = 0$$

에서 $a = -2$ 또는 $a = -6$

$a = -6$ 이면 (a)와 같다.


$a = -2$ 이면

$$h(x) = (x-2)(3x-2)(x^2 - 2x)$$

$$= x(3x-2)(x-2)^2$$

곡선 $y = |h(x)|$ 는 그림과 같으므로

함수 $h(x)$ 는 조건 (나)를 만족시키지 않는다.



(ii) $k = -\frac{a}{3}$ ($a \neq -6$)인 경우

다항식 $h(x)$ 가 $\left(x + \frac{a}{3}\right)^2$ 을 인수로 가지므로

다항식 $x^2 + 2(a+1)x + (a+2)^2$ 이 $x + \frac{a}{3}$ 를

인수로 가진다.

$$\frac{1}{9}a^2 - \frac{2}{3}a(a+1) + (a+2)^2$$

$$= \frac{4}{9}a^2 + \frac{10}{3}a + 4$$


$$= \frac{2}{9}(2a+3)(a+6) = 0$$

에서 $a = -\frac{3}{2}$ 이므로

$$h(x) = (x-2) \left(3x - \frac{3}{2} \right) \left(x^2 - x + \frac{1}{4} \right)$$

$$= 3 \left(x - \frac{1}{2} \right)^3 (x-2)$$

꼭선 $y = |h(x)|$ 는 그림과 같으므로
함수 $h(x)$ 는 조건 (나) 를 만족시킨다.



이 경우 $h(-1) = \frac{243}{8}$

(iii) $x^2 + 2(a+1)x + (a+2)^2 = (x-k)^2$ 인 경우
 $x^2 + 2(a+1)x + (a+2)^2 = x^2 - 2kx + k^2$ 에서

$$a+1 = -k, \quad (a+2)^2 = k^2$$

$$(a+2)^2 = (-a-1)^2 \text{에서 } a = -\frac{3}{2}$$

$a = -\frac{3}{2}$ 이면 (ii) 와 같다.

따라서 $h(-1)$ 의 최솟값은 $\frac{243}{8}$ 이므로

$p = 8, q = 243$ 에서 $p+q = 251$

2021학년도 4월 고3 전국연합학력평가 정답 및 해설

• 2교시 수학 영역 •

[확률과 통계]

23	㉔	24	㉕	25	㉖	26	㉗	27	㉘
28	㉙	29	288	30	206				

23. [출제의도] 중복순열 계산하기

$${}_n\Pi_2 = n^2 = 25 \text{에서 } n = 5$$

24. [출제의도] 이항정리 이해하기

다항식 $(x+2a)^5$ 의 전개식에서 일반항은

$${}_5C_r(2a)^r x^{5-r} = {}_5C_r 2^r a^r x^{5-r}$$

x^3 의 계수는 $r=2$ 일 때이므로

$${}_5C_2 \times 2^2 \times a^2 = 40a^2 = 640$$

따라서 $a=4$

25. [출제의도] 중복조합 이해하기

빨간색 볼펜 5자루를 4명의 학생에게 나누어 주는 경우의 수는 서로 다른 4개에서 중복을 허락하여 5개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로

$${}_4H_5 = {}_8C_5 = {}_8C_3 = 56$$

파란색 볼펜 2자루를 4명의 학생에게 나누어 주는 경우의 수는 서로 다른 4개에서 중복을 허락하여 2개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로

$${}_4H_2 = {}_5C_2 = 10$$

따라서 구하는 경우의 수는 $56 \times 10 = 560$

26. [출제의도] 중복순열 이해하기

만의 자리의 수가 될 수 있는 수는 1 또는 2이므로

만의 자리의 수를 정하는 경우의 수는 2

천의 자리, 백의 자리, 십의 자리의 수를 정하는

경우의 수는 1, 2, 3, 4, 5의 5개에서 중복을 허락하여 3개를 택해 일렬로 나열하는 중복순열의 수와 같으므로 ${}_5\Pi_3 = 5^3 = 125$

일의 자리의 수가 될 수 있는 수는 1 또는 3 또는 5이므로 일의 자리의 수를 정하는 경우의 수는 3 따라서 구하는 경우의 수는 $2 \times 125 \times 3 = 750$

27. [출제의도] 이항계수의 성질을 이용하여 추론하기


$${}_{2n+1}C_0 + {}_{2n+1}C_2 + {}_{2n+1}C_4 + \dots + {}_{2n+1}C_{2n} = 2^{2n}$$

$$\text{이므로 } f(n) = \sum_{k=1}^n {}_{2n+1}C_{2k} = 2^{2n} - 1$$

$$2^{2n} - 1 = 1023 \text{에서 } 2^{2n} = 2^{10}$$

따라서 $n=5$

28. [출제의도] 같은 것이 있는 순열을 활용하여 문제 해결하기



그림과 같이 세 지점 Q_1, Q_2, Q_3 를 정하면

A지점에서 출발하여 P지점까지 가기 위해서는 Q_1 지점 또는 Q_2 지점 중 한 지점을 지나야 하고

P지점에서 출발하여 B지점까지 가기 위해서는 Q_2 지점 또는 Q_3 지점 중 한 지점을 지나야 한다.

그러므로 A지점에서 출발하여 P지점을 지나 B지점으로 갈 때, 한 번 지난 도로는 다시 지나지 않으면서 최단거리로 가는 경우와 각각의 경우의 수는 다음과 같다.

(i) $A \rightarrow Q_1 \rightarrow P \rightarrow Q_2 \rightarrow B$ 의 순서로 이동하는 경우

$$\frac{4!}{1! \times 3!} \times 1 \times 1 \times 1 \times \frac{4!}{2! \times 2!} = 24$$

(ii) $A \rightarrow Q_1 \rightarrow P \rightarrow Q_3 \rightarrow B$ 의 순서로 이동하는 경우

$$\frac{4!}{1! \times 3!} \times 1 \times 1 \times \frac{5!}{2! \times 3!} = 40$$

(iii) $A \rightarrow Q_2 \rightarrow P \rightarrow Q_3 \rightarrow B$ 의 순서로 이동하는 경우

$$\frac{3!}{1! \times 2!} \times 1 \times 1 \times 1 \times \frac{5!}{2! \times 3!} = 30$$

(i), (ii), (iii)에 의해 구하는 경우의 수는 $24 + 40 + 30 = 94$

29. [출제의도] 원순열을 이용하여 추론하기

남학생 4명 중 A, B가 아닌 남학생 2명을 D, E라 하면

(i) C가 D, E와 모두 이웃하는 경우

A, B를 한 학생으로 생각하고, D, C, E를 한 학생으로 생각하여

5명의 학생을 원형으로 배열하는 경우의 수는 $(5-1)! = 4! = 24$

이 각각에 대하여 A, B가 서로 자리를 바꾸는 경우의 수는 2!, D, E가 서로 자리를 바꾸는 경우의 수는 2!이므로 구하는 경우의 수는 $24 \times 2! \times 2! = 96$

(ii) C가 A 또는 B 중 한 명과 이웃하는 경우

D 또는 E 중 한 명과 C, A, B의 총 4명을 한 학생으로 생각하여

5명의 학생을 원형으로 배열하는 경우의 수는 $(5-1)! = 4! = 24$

이 각각에 대하여 D 또는 E 중 한 명을 선택하는 경우의 수는 ${}_2C_1$, A, B가 서로 자리를 바꾸는 경우의 수는 2!, A, B를 한 학생으로 생각하여 C와 이웃한 두 학생이 서로 자리를 바꾸는 경우의 수는 2!이므로 구하는 경우의 수는 $24 \times {}_2C_1 \times 2! \times 2! = 192$

(i), (ii)에 의해 구하는 경우의 수는 $96 + 192 = 288$

30. [출제의도] 중복조합을 활용하여 문제해결하기

6 이하의 음이 아닌 네 정수 y_1, y_2, y_3, y_4 에 대하여

$$x_1 = 2y_1 + 1, \quad x_2 = 2y_2 + 2,$$

$$x_3 = 2y_3 + 1, \quad x_4 = 2y_4 + 2 \text{라 하면}$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 34 \text{에서}$$

$$(2y_1 + 1) + (2y_2 + 2) + (2y_3 + 1) + (2y_4 + 2) = 34,$$

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 14 \dots \textcircled{1}$$

구하는 모든 순서쌍 (x_1, x_2, x_3, x_4) 의 개수는

방정식 $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 14$ 를 만족시키는

음이 아닌 네 정수 y_1, y_2, y_3, y_4 의 모든

순서쌍 (y_1, y_2, y_3, y_4) 에서

$y_k \geq 7$ 인 4 이하의 자연수 k 가 존재하는

순서쌍 (y_1, y_2, y_3, y_4) 를 제외한 개수와 같다.

(i) 방정식 $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 14$ 를 만족시키는

음이 아닌 네 정수 y_1, y_2, y_3, y_4 의

모든 순서쌍 (y_1, y_2, y_3, y_4) 의 개수는

서로 다른 4개에서 중복을 허락하여

14개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로

$${}_4H_{14} = {}_{17}C_{14} = {}_{17}C_3 = \frac{17 \times 16 \times 15}{3 \times 2 \times 1} = 680$$

(ii) $y_k \geq 7$ 인 k 의 값이 1개인 경우

$y_1 \geq 7$ 이라 하자.

$$z_1 = y_1 - 7 \text{이라 하면 방정식 } \textcircled{1} \text{은}$$

$$z_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 7$$

방정식 $z_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 7$ 을 만족시키는

음이 아닌 네 정수 z_1, y_2, y_3, y_4 의 모든

순서쌍 (z_1, y_2, y_3, y_4) 의 개수는

서로 다른 4개에서 중복을 허락하여

7개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로

$${}_4H_7 = {}_{10}C_3 = 120$$

이때 $y_1 \geq 7$ 인 2 이상 4 이하의 자연수 l 이

존재하는 순서쌍 (z_1, y_2, y_3, y_4) 는

$(0, 7, 0, 0), (0, 0, 7, 0), (0, 0, 0, 7)$ 의

3가지이므로 $120 - 3 = 117$

같은 방법으로 $y_k \geq 7$ 인 2 이상 4 이하의

자연수 k 가 존재하는 순서쌍 (y_1, y_2, y_3, y_4) 의

개수도 각각 117이다.

따라서 $y_k \geq 7$ 인 k 의 값이 1개인

순서쌍 (y_1, y_2, y_3, y_4) 의 개수는

$$4 \times 117 = 468$$

(iii) $y_k \geq 7$ 인 k 의 값이 2개인 경우

순서쌍 (y_1, y_2, y_3, y_4) 는 $(7, 7, 0, 0),$

$(7, 0, 7, 0), (7, 0, 0, 7), (0, 7, 7, 0),$

$(0, 7, 0, 7), (0, 0, 7, 7)$ 의 6가지이다.

(i), (ii), (iii)에 의해

구하는 모든 순서쌍 (x_1, x_2, x_3, x_4) 의 개수는

$$680 - (468 + 6) = 206$$

[미적분]

23	㉔	24	㉕	25	㉖	26	㉗	27	㉘
28	㉙	29	18	30	13				

23. [출제의도] 수열의 극한 계산하기

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + 3^{n+1}}{3^n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3} \right)^n + 3 = \frac{0+3}{1+0} = 3$$

24. [출제의도] 로그함수의 미분 이해하기

$$f(x) = \log_3 6x = \log_3 6 + \log_3 x$$

$$f'(x) = (\log_3 6 + \log_3 x)' = \frac{1}{x \ln 3}$$

$$\text{따라서 } f'(9) = \frac{1}{9 \ln 3}$$

25. [출제의도] 급수의 성질 이해하기

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{n} - 2 \right) \text{가 수렴하므로 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 2$$

$$\text{따라서 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 3na_n}{n^2 + 4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + 3 \times \frac{a_n}{n}}{1 + \frac{4}{n^2}} = \frac{2 + 3 \times 2}{1 + 0} = 8$$

26. [출제의도] 지수함수의 극한 이해하기

$x=t$ 일 때 두 점 P, Q의 y 좌표는 각각 e^{2t+k}, e^{-3t+k} 이고

$\overline{PQ}=t$ 를 만족시키는 k 의 값이 $f(t)$ 이므로

$$e^{2t+f(t)} - e^{-3t+f(t)} = t$$

$$e^{f(t)}(e^{2t} - e^{-3t}) = t$$

$$e^{f(t)} = \frac{t}{e^{2t} - e^{-3t}}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} e^{f(t)} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t}{e^{2t} - e^{-3t}}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{2 \times \frac{e^{2t} - 1}{2t} + 3 \times \frac{e^{-3t} - 1}{-3t}}$$

$$= \frac{1}{2 \times 1 + 3 \times 1} = \frac{1}{5}$$

27. [출제의도] 삼각함수의 극한을 활용하여 문제해결하기

점 P와 점 Q에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 P', Q' 이라 하면 $\overline{OP'}=t, \overline{OQ'}=f(t)$

$$\overline{OP} = \sqrt{t^2 + t^2 \sin^2 t} = t\sqrt{1 + \sin^2 t}$$

$$\overline{OQ} = \overline{OP} - \overline{PQ} = t(\sqrt{1 + \sin^2 t} - 1)$$

삼각형 OPP' 과 삼각형 $OQ'Q'$ 은 서로 닮음이므로

$$\overline{OP'} : \overline{OQ'} = \overline{OP} : \overline{OQ}$$

$$t : f(t) = t\sqrt{1 + \sin^2 t} : t(\sqrt{1 + \sin^2 t} - 1)$$

$$f(t) = \frac{t(\sqrt{1 + \sin^2 t} - 1)}{\sqrt{1 + \sin^2 t}}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t)}{t^3} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1 + \sin^2 t} - 1}{t^2 \sqrt{1 + \sin^2 t}}$$


$$= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(\sqrt{1 + \sin^2 t} - 1)(\sqrt{1 + \sin^2 t} + 1)}{t^2 \sqrt{1 + \sin^2 t} (\sqrt{1 + \sin^2 t} + 1)}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin^2 t}{t^2 \sqrt{1 + \sin^2 t} (\sqrt{1 + \sin^2 t} + 1)}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{\sin t}{t}\right)^2 \times \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{1 + \sin^2 t} (\sqrt{1 + \sin^2 t} + 1)}$$

$$= 1^2 \times \frac{1}{\sqrt{1} \times (\sqrt{1} + 1)} = \frac{1}{2}$$

28. [출제의도] 등비수열을 활용하여 문제해결하기



원 O_1 의 반지름의 길이가 2이므로
반원의 넓이는 2π

직각삼각형 $C_1A_1B_1$ 에서 $\overline{A_1C_1}=3, \overline{A_1B_1}=4$ 이므로
 $\overline{B_1C_1} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$

선분 A_1B_1 은 원 O_1 의 지름이므로 $\angle A_1D_1B_1 = \frac{\pi}{2}$

삼각형 $C_1A_1B_1$ 에서

$\frac{1}{2} \times \overline{A_1B_1} \times \overline{A_1C_1} = \frac{1}{2} \times \overline{B_1C_1} \times \overline{A_1D_1}$ 이므로


$$\overline{A_1D_1} = \frac{12}{5}$$

직각삼각형 $B_1D_1A_1$ 에서 $\overline{B_1D_1} = \sqrt{4^2 - \left(\frac{12}{5}\right)^2} = \frac{16}{5}$

삼각형 $B_1D_1A_1$ 의 넓이는 $\frac{1}{2} \times \frac{12}{5} \times \frac{16}{5} = \frac{96}{25}$

그러므로 $S_1 = 2\pi + \frac{96}{25}$ 이다.

다음은 그림 R_{n+1} 의 일부이다.



두 원 O_n 과 O_{n+1} 의 중심을 각각 O_n 과 O_{n+1} 이라 하고 반지름의 길이를 각각 r_n 과 r_{n+1} 이라 하자.

직선 $A_{n+1}B_{n+1}$ 이 선분 B_nC_n 과 만나는 점을 E_{n+1} 이라 하고, 원 O_{n+1} 과 직선 B_nC_n 이 접하는 점을 F_{n+1} 이라 하자.

$\overline{A_{n+1}C_n} = a_n$ 이라 하면 $\overline{F_{n+1}C_n} = a_n$ 이고
삼각형 $A_nB_nC_n$ 과 삼각형 $A_{n+1}E_{n+1}C_n$ 은 서로 닮음이므로

$$\overline{A_{n+1}C_n} : \overline{E_{n+1}C_n} = 3 : 5 \text{에서 } \overline{E_{n+1}C_n} = \frac{5}{3}a_n \text{이고}$$

$$\overline{E_{n+1}F_{n+1}} = \overline{E_{n+1}C_n} - \overline{F_{n+1}C_n} = \frac{2}{3}a_n \text{이다.}$$

삼각형 $A_{n+1}E_{n+1}C_n$ 과 삼각형 $F_{n+1}E_{n+1}O_{n+1}$ 은 서로 닮음이므로

$$\overline{O_{n+1}F_{n+1}} : \overline{E_{n+1}F_{n+1}} = 3 : 4 \text{에서 } a_n = 2r_{n+1} \text{이다.}$$

점 O_{n+1} 에서 선분 A_nO_n 에 내린 수선의 발을 G_{n+1} 이라 하면

$$\overline{O_{n+1}G_{n+1}} = \overline{A_nC_n} - \overline{A_{n+1}C_n} = \frac{3}{2}r_n - 2r_{n+1}$$

$\overline{O_nG_{n+1}} = r_n - r_{n+1}, \overline{O_nO_{n+1}} = r_n + r_{n+1}$ 이므로
직각삼각형 $O_nG_{n+1}O_{n+1}$ 에서

$$(r_n + r_{n+1})^2 = (r_n - r_{n+1})^2 + \left(\frac{3}{2}r_n - 2r_{n+1}\right)^2$$

$$16r_{n+1}^2 - 40r_{n+1}r_n + 9r_n^2 = 0$$

$$(4r_{n+1} - r_n)(4r_{n+1} - 9r_n) = 0$$

$$r_n > r_{n+1} \text{이므로 } r_{n+1} = \frac{1}{4}r_n$$

원 O_n 과 원 O_{n+1} 의 넓이비가 4:1이며 넓이의 비는 16:1이다.

따라서 S_n 은 첫째항이 $2\pi + \frac{96}{25}$ 이고 공비가 $\frac{1}{16}$ 인

등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{2\pi + \frac{96}{25}}{1 - \frac{1}{16}} = \frac{32}{15}\pi + \frac{512}{125}$$

29. [출제의도] 삼각함수의 덧셈정리를 이용하여 추론하기

삼각형 BCD는 이등변삼각형이므로
 $\angle CBD = \angle DCB = \alpha$ 이고 $\angle CDA = 2\alpha$

삼각형 ADC에서 $\beta = \frac{\pi}{3} - 2\alpha$

$$\cos 2\alpha = \cos \alpha \cos \alpha - \sin \alpha \sin \alpha$$

$$= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$= 2\cos^2 \alpha - 1 = \frac{\sqrt{21}}{7}$$

$$\sin^2 2\alpha = 1 - \cos^2 2\alpha = \frac{28}{49} \text{이고}$$

$$0 < 2\alpha < \pi \text{이므로 } \sin 2\alpha = \frac{2\sqrt{7}}{7}$$

$$\tan 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$\tan \beta = \tan\left(\frac{\pi}{3} - 2\alpha\right)$$

$$= \frac{\tan \frac{\pi}{3} - \tan 2\alpha}{1 + \tan \frac{\pi}{3} \times \tan 2\alpha}$$

$$= \frac{\sqrt{3} - \frac{2\sqrt{3}}{3}}{1 + \sqrt{3} \times \frac{2\sqrt{3}}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{9}$$

$$\text{따라서 } 54\sqrt{3} \times \tan \beta = 18$$

30. [출제의도] 수열의 극한을 이용하여 추론하기

$|x| > 1$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x^{2n}} = 0$ 이므로

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a + \frac{b}{x} + \frac{1}{x^{2n-1}}}{1 + \frac{2}{x^{2n}}} = a + \frac{b}{x}$$

$$x = 1 \text{일 때, } f(1) = \frac{a+b+1}{3}$$

$$x = -1 \text{일 때, } f(-1) = \frac{a-b-1}{3}$$

$|x| < 1$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{2n} = 0$ 이므로

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{ax^{2n} + bx^{2n-1} + x}{x^{2n} + 2} = \frac{0+0+x}{0+2} = \frac{x}{2}$$

따라서

$$f(x) = \begin{cases} a + \frac{b}{x} & (|x| > 1) \\ \frac{a+b+1}{3} & (x = 1) \\ \frac{a-b-1}{3} & (x = -1) \\ \frac{x}{2} & (|x| < 1) \end{cases}$$

함수 $g(x) = 2(x-1) + m$ 이라 하면

방정식 $f(x) = 2(x-1) + m$ 의 실근의 개수는

두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 개수와 같다.


$x < -1$ 에서 $f(x)$ 는 감소하고 $x > 1$ 에서 $f(x)$ 는 감소하므로 $|x| > 1$ 에서 두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 개수의 최댓값은 2이고,

$|x| < 1$ 에서 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 $\frac{1}{2}$ 인

일차함수이므로 두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 개수의 최댓값은 1이다.

그러므로 $c_k = 5$ 인 자연수 k 가 존재하려면

$f(1)=g(1)$, $f(-1)=g(-1)$ 이어야 하고,
두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프의 개형은
그림과 같아야 한다.



즉, 직선 $y=2(x-1)+k$ 는
두 점 $(1, \frac{a+b+1}{3})$, $(-1, \frac{a-b-1}{3})$ 을 지나므로
 $\frac{a+b+1}{3}=k$, $\frac{a-b-1}{3}=k-4$ 에서
 $b=5$

$k=\frac{a}{3}+2$ 가 자연수이므로 a 는 3의 배수이다. ... ㉓


$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) < f(-1) < \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ 이어야 하므로

$a-5 < \frac{a}{3}-2 < -\frac{1}{2}$ 에서 $a < \frac{9}{2}$... ㉔

$a > 0$ 이므로 $\frac{1}{2} < \frac{a}{3}+2 < a+5$ 가 성립하며

$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) < f(1) < \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ 를 만족시킨다.

㉓, ㉔에 의해 $0 < a < \frac{9}{2}$ 이므로 $a=3$, $k=3$



(i) $m=1$ 일 때
 $g(-1)=-3$, $g(1)=1$ 이므로 $y=f(x)$ 의
그래프와 $y=g(x)$ 의 그래프는 $-1 < x < 1$,
 $x > 1$ 에서 각각 1개씩 교점을 갖는다.
그러므로 $c_1=2$

(ii) $m=2$ 일 때
 $g(-1)=-2$, $g(1)=2$ 이므로 $y=f(x)$ 의
그래프와 $y=g(x)$ 의 그래프는 $x=0$,
 $x > 1$ 에서 각각 1개씩 교점을 갖는다.
그러므로 $c_2=2$

(iii) $m=3$ 일 때
 $m=k=3$ 이므로 $c_3=5$

(iv) $4 \leq m \leq 7$ 일 때
 $g(-1) > \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\frac{1}{2}$,

$g(1) < \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 8$ 이므로
 $y=f(x)$ 의 그래프와 $y=g(x)$ 의 그래프는
 $x < -1$, $x > 1$ 에서 각각 1개씩 교점을 갖는다.
그러므로 $c_m=2$

(v) $m \geq 8$ 일 때
 $g(-1) > \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\frac{1}{2}$,
 $g(1) \geq \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 8$ 이므로

$y=f(x)$ 의 그래프와 $y=g(x)$ 의 그래프는
 $x < -1$ 에서 1개의 교점을 갖는다.
그러므로 $c_m=1$

(i) ~ (v)에 의해
 $k + \sum_{m=1}^{\infty} (c_m - 1) = 3 + 1 + 1 + 4 + 1 \times 4 = 13$

[기하]

23	①	24	③	25	②	26	④	27	⑤
28	⑤	29	115	30	63				

23. [출제의도] 벡터의 연산 계산하기

$$(2\vec{a}-m\vec{b})-(n\vec{a}-4\vec{b})=(2-n)\vec{a}-(m-4)\vec{b}$$

$$=\vec{a}-\vec{b}$$

에서 $m-4=1$, $2-n=1$ 이므로
 $m=5$, $n=1$
따라서 $m+n=6$

24. [출제의도] 쌍곡선의 접선의 방정식 이해하기

쌍곡선 $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{7}=1$ 위의 점 $(4, 7)$ 에서의

$$\text{접선의 방정식은 } \frac{4x}{2}-\frac{7y}{7}=1,$$

$$2x-y=1$$

따라서 구하는 접선의 x절편은 $\frac{1}{2}$

25. [출제의도] 타원의 정의 이해하기

점 Q는 점 P와 원점에 대하여 대칭인 점이므로
 $\vec{OP}=\vec{OQ}$, $\vec{QF}'=\vec{PF}$
 $\vec{PF}'+\vec{QF}'=\vec{PF}'+\vec{PF}=12$
삼각형 PF'Q의 둘레의 길이가 20이므로 $\vec{PQ}=8$
따라서 $\vec{PQ}=2\vec{OP}$ 에서 $\vec{OP}=4$

26. [출제의도] 포물선의 정의 이해하기

점 A에서 포물선의 준선에 내린 수선의 발을 H라
하면 포물선의 정의에 의해 $\vec{HA}=\vec{FA}=8$

$$\vec{CA}=\vec{HA}-\vec{HC}=8-p$$

$$\vec{FB}=\vec{OB}-\vec{OF}=8-2p$$

$$\vec{AB}=h \text{라 하면}$$

사다리꼴 OFAC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times ((8-p)+p) \times h = 4h$$

직각삼각형 FBA의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times (8-2p) \times h = (4-p)h$$

$$4h : (4-p)h = 2 : 1 \text{이므로 } p=2$$

$$\vec{FB}=4 \text{이므로 직각삼각형 FBA에서}$$

$$h = \sqrt{8^2-4^2} = 4\sqrt{3}$$

따라서 삼각형 ACF의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 6 \times 4\sqrt{3} = 12\sqrt{3}$$

27. [출제의도] 쌍곡선의 정의를 이용하여 추론하기

쌍곡선 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 의 주축의 길이가 4이므로

$$\vec{PF}'-\vec{PF}=4 \text{에서 } \vec{PF}'=7$$

타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{7}=1$ 의 장축의 길이가 $2|a|$ 이므로

$$\vec{PF}'+\vec{PF}=7+3=2|a| \text{에서 } a^2=25$$

타원 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{7}=1$ 에서 $c^2=25-7=18$

쌍곡선 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 에서 $4+b^2=c^2=18$, $b^2=14$

따라서 $a^2+b^2=25+14=39$

28. [출제의도] 이차곡선을 이용하여 추론하기

점 $F(\frac{9}{4}, 0)$ 이 포물선의 초점이므로

준선의 방정식은 $x=-\frac{9}{4}$

점 P의 좌표를 (x_1, y_1) 이라 하면

$$\vec{PF}=x_1+\frac{9}{4}=\frac{25}{4} \text{에서 } x_1=4, y_1=6$$

포물선 위의 점 P에서의 접선의 방정식은

$$6y=\frac{9}{2}(x+4) \text{이고 점 } F' \text{을 지나므로 } c=4$$

$$P(4, 6), F'(-4, 0) \text{이므로 } \vec{PF}'=10$$

타원의 장축의 길이는 $\vec{PF}'+\vec{PF}=\frac{65}{4}$ 이고

$$\vec{F}'F=4+\frac{9}{4}=\frac{25}{4} \text{이므로}$$

타원의 단축의 길이를 k 라 하면

$$\left(\frac{k}{2}\right)^2 = \left(\frac{65}{8}\right)^2 - \left(\frac{25}{8}\right)^2 = \frac{225}{4}$$

따라서 타원의 단축의 길이는 15

29. [출제의도] 벡터의 연산을 활용하여 문제해결하기

(i) 두 점 A, O의 중점을 M이라 하면

$$\vec{OM}+\vec{AM}=\vec{0} \text{이므로}$$

$$\vec{OP}+\vec{AQ}=(\vec{OM}+\vec{MP})+(\vec{AM}+\vec{MQ})$$

$$=\vec{MP}+\vec{MQ}$$

$|\vec{MP}|=1$ 이므로 두 벡터 \vec{MP} , \vec{MQ} 의 방향이
같고 $|\vec{MQ}|$ 의 값이 최대일 때, $|\vec{MP}+\vec{MQ}|$ 의
값은 최대이다. 그러므로 선분 MC와
반원의 호가 만나는 점을 X라 하면

점 Q가 점 C이고 점 P가 점 X일 때
 $|\vec{MP}+\vec{MQ}|$ 의 값은 최대이다.


$$\vec{MC}=\sqrt{3^2+1^2}=\sqrt{10} \text{이므로}$$

$$|\vec{MP}+\vec{MQ}| \leq |\vec{MX}+\vec{MC}|=\sqrt{10}+1$$

따라서 $M=\sqrt{10}+1$

$$(ii) \vec{OP}+\vec{AQ}=(\vec{OA}+\vec{AP})+(\vec{AO}+\vec{OQ})$$

$$=\vec{AP}+\vec{OQ}$$



삼각형 BCD 위의 임의의 점 Q에 대하여
 $\vec{QY}=\vec{AP}$ 인 점을 Y라 하자.

$$|\vec{AP}+\vec{OQ}|=|\vec{QY}+\vec{OQ}|=|\vec{OY}| \geq |\vec{OQ}|$$

이므로 점 Y가 점 Q일 때 $|\overline{AP} + \overline{OQ}|$ 의 값은
 최소이다. 점 Q가 선분 BD 위에 있고
 $\overline{OQ} \perp \overline{BD}$ 일 때 $|\overline{OQ}|$ 의 값은 최소이므로


$$m = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

(i), (ii)에 의해

$$M^2 + m^2 = (11 + 2\sqrt{10}) + \frac{1}{2} = \frac{23}{2} + 2\sqrt{10}$$

따라서 $p = \frac{23}{2}$, $q = 10$ 이므로 $p \times q = 115$

30. [출제의도] 타원의 정의를 활용하여 문제해결하기



$$c^2 = 16 - 7 = 9, c = 3$$

$$\overline{FF'} = 2c = 6$$

직선 FP가 원 C와 접하는 점을 R라 하고

$\overline{PQ} = a$ 라 하면

$$\overline{PF} = 2\overline{PQ} = 2a \text{이므로 } \overline{RF} = \overline{PF} - \overline{PR} = \overline{PF} - \overline{PQ} = a$$

$\overline{PR} = \overline{RF}$ 이고, $\angle PRC = 90^\circ$ 이므로

삼각형 PCR, FCR가 서로 합동이다.

$$\overline{CP} = l \text{이라 하면 } \overline{CP} = \overline{FC} \text{에서 } \overline{F'C} = 6 - l$$

$$\overline{PF'} = \overline{PQ} + \overline{QF'} \text{이고}$$

$$\overline{PF'} + \overline{PF} = 8 \text{이므로 } \overline{QF'} = 8 - 3a$$

점 P가 제1사분면 위의 점이므로

$$\overline{PF'} > \overline{PF} \text{에서 } a < 2 \dots \textcircled{1}$$

삼각형 FPF'에서 $\angle F'PC = \angle CPF$ 이므로

$$\overline{PF'} : \overline{PF} = \overline{F'C} : \overline{CF}$$

$$(8 - 2a) : 2a = (6 - l) : l \text{에서 } l = \frac{3}{2}a \dots \textcircled{2}$$

점 Q는 점 C에서 선분 PF'에 내린 수선의

$$\text{발이므로 } \overline{F'C}^2 - \overline{F'Q}^2 = \overline{CP}^2 - \overline{PQ}^2$$

$$(6 - l)^2 - (8 - 3a)^2 = l^2 - a^2 \dots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{2}, \textcircled{3} \text{에 의해 } 4a^2 - 15a + 14 = 0$$

$$(a - 2)(4a - 7) = 0 \text{에서 } a = 2 \text{ 또는 } a = \frac{7}{4}$$

$$\textcircled{1} \text{에 의해 } a = \frac{7}{4}, l = \frac{21}{8}$$

따라서 $24 \times \overline{CP} = 63$